

376.58

37798
P. Puschmann
9. Bausing
mus.

Verzeichnifs

einer

Sammlung

von

Säugethieren und Vögeln

aus dem Kaffernlande,

nebst einer

Käfer-Sammlung,

welche

am 14^{ten} März 1842

durch

den Königl. gerichtlichen Auctions-Commissarius

Rauch

öffentlich meistbietend verkauft

werden sollen.


Berlin.

Gedruckt in der Druckerei der Königlichen Akademie
der Wissenschaften.

1842.



193782



QL

72

V57

1842

SCNHRB (C-1)

Vorwort.

Abermals sind unserer zoologischen Sammlung werthvolle zoologische Sendungen aus dem südlichen Africa zugekommen, die, da sie nicht im Ganzen angekauft werden konnten, zur öffentlichen Versteigerung gebracht werden sollen. Herr Ludwig Krebs hat auf seinen letzten Reisen die Gegenden im Nord-Osten der Capcolonie, um den Liqua-Fluss, jenseits der Bambus Berge besucht und die Standörter der seltensten Vierfüßer und Vögel berührt, so daß diesmal seine Sendung nur wenige der wohlbekannten und in allen Museen zu findenden Thiere der Cap Colonie enthielt, dagegen reich war an den, erst durch die neueren Forschungen der Engländer, namentlich durch Dr. Andr. Smith entdeckten und in seinen vortrefflichen *Illustrations of the Zoology of South-Africa* beschriebenen Arten. Der Mangel dieses Werkes hinderte die richtige Namenbestimmung der unbekannten Gegenstände nicht wenig, da sie doch ohne dessen vorgängige Zuziehung nicht für neu erklärt und mit von uns selbst gegebenen Namen versehen werden konnten. Erst nachdem Hr. Dr. Hartlaub in Bremen auf meine Bitte sein Exemplar der *Illustrations* zu unserm Gebrauch dargeliehen, konnte ein ge-

naues Inventarium der Sendung angelegt und das Unbekannte, auch dort und in den andern zu Gebot stehenden neueren Werken nicht Beschriebene, für neu angesprochen und als Entdeckung des Einsenders aufgestellt werden. Solchen Arten sind dann in dem nachfolgenden Verzeichnifs kurze Beschreibungen in der lateinischen Kunstsprache beigefügt worden, die wir auch da nicht für überflüssig halten; wo besonders merkwürdige, von Smith entdeckte Arten, einer näheren Bezeichnung ihres Werthes zu bedürfen scheinen.

Die Reise in so entlegene Landstriche nicht nur, sondern auch der Transport so vieler bedeutend grosser Thiere hat so schwere Kosten verursacht, dafs wir alle Ursach haben, zu wünschen, der Verkauf möge sie wieder einbringen. Doch waren neben dem Bemühn, den Werth dieser Sendung zum Besten ihres Urhebers in das rechte Licht zu stellen, auch Pflichten gegen die etwanigen Käufer zu erfüllen. Es konnte nicht genügen, die Seltenheit der Arten, und die Grösse der Exemplare zu bezeichnen, sondern es mußte auch die Tauglichkeit der Exemplare für eine kunstgerechte Aufstellung in einer zoologischen Sammlung untersucht werden. Da es nun so oft geschieht, dafs Säugethierhäute, die in dem getrockneten Zustand, wie sie ankommen, ganz wohlerhalten aussehn, beim Aufweichen unverbesserliche Fehler zu erkennen geben, indem das Haar an einzelnen Stellen, die etwa von Fäulnifs angegriffen gewesen, los läfst, ja eine Haut, wenn solche Beschädigung weiten Umfang gewonnen, für die Aufstellung in einem auf Sauberkeit

der Exemplare haltenden Museum ganz unbrauchbar werden kann, so ist die Vorsicht gebraucht, alle die gröfseren Häute gleich nach ihrer Ankunft von dem hiesigen geschickten Weifsgerber-Meister Hrn. Müller aufweichen und durch Bereitung in Alaunbrühe zum sichern mottenfreien Ausstopfen präpariren zu lassen, was den Vortheil für die Käufer gewährt, dafs man ihnen den Zustand jedes Exemplars im Catalog genau anzugeben, und Alles im weichen Zustande in Fässer verpackt zu übersenden im Stande ist, worauf denn die Arbeit der Aufstellung gleich nach dem Empfang vorgenommen oder auch beliebig verschoben werden kann, da ein weiteres Verderben nicht zu befürchten steht. Wir hoffen also durch die Sorgfalt, welche auf diese Zubereitung verwendet ist, sowohl dem unermüdeten Sammler als den Käufern dieser Seltenheiten einen wesentlichen Dienst geleistet zu haben und die dabei verwendeten Auslagen durch die Sicherheit eines ehrenhaften Gebotes wieder eingebracht zu sehen.

Um den Liebhabern einen Maafsstab für ihr Gebot an die Hand zu geben, sind bei allen Arten, welche in dem neuesten Preis-Verzeichnisse südafrikanischer Thiere von Hrn C. F. Drege in Hamburg aufgeführt sind, die daselbst geforderten Preise beigefügt, indem daraus wenigstens das Verhältnifs, in welchem die Arten untereinander nach ihrer Schönheit und Seltenheit stehn, ersichtlich wird. Wo aber neue, oder von Hrn Drege nicht ausgetotete Arten vorkommen, habe ich selbst den Preis, auf welchen ich

sie schätzen würde, zu beliebiger Berücksichtigung angegeben.

Die hier gleichzeitig mit zum öffentlichen Verkauf kommende Käfer-Sammlung ist reich an seltenen Gegenständen, die aber nicht näher specificirt werden können, als es an seinem Ort in diesem Catalog geschehen ist, wo überdies die nöthigen Bemerkungen über den Werth der Sammlung beigefügt sind.

Die im Anhang verzeichneten mexicanischen Gegenstände sind besonders gut präparirt und vom frischesten Ansehn.

Berlin im December 1841.

Lichtenstein.

Aufträge auswärtiger Käufer übernehmen:

Hr. Insp. Rammelsberg, im Universitäts-Gebäude.

- | | | |
|---|----------------------------------|---------|
| » | Commissionär Röse, Behrenstrafse | Nr. 44. |
| » | » Walther, Leipzigerstrafse | » 29. |
| » | » Mayer, Grünstrafse | » 15. |
| » | » Seemann, Rosengasse | » 53. |

A. Säugethiere.

I. Felle. (*)

1. *Felis Leo Mas.* Ein sehr schönes Exemplar, von 7 Fufs 3 Zoll Länge von der Schnauze bis zur Schwanzwurzel, der Schwanz 3 F. 3 Z. lang; die Mähne sehr stark. Der vollständige Schädel mit dem Gebifs in der Haut. 200 Mark oder 80 Thlr.
2. *Equus Burchellii* Gray. Eine vollständige Haut mit dem Schädel daneben, 8 F. lang 4 F. 3 Z. hoch, an den Weichen einige nackte Stellen. 150 Mark oder 60 Thlr.
3. *Equus Burchellii.* Eben so. 7 F. 6 Z. lang. Fast ohne einen Fleck.
4. *Equus Burchellii.* Eben so. 7. F. 4 Z. lang. Hin und wieder kleine Stellen von 1 bis 2 Zoll Gröfse nackt.
5. *Hyaena maculata.* 4 F. 2 Z. lange Haut mit dem Schädel, sehr gut erhalten. 50 Mark oder 20 Thlr.
6. *Otocyon Caffer* Licht. (*Canis megalotis* Desm.) Trockne Haut mit vollständigem Schädel. Länge des Leibes 1 F. 8 Z., des Schwanzes 7 Z. 16 Thlr.
7. *Otocyon Caffer.* Eben so. Gleiche Gröfse. 16 Thlr.
8. *Felis obscura* Desm. Eben so. 1 F. 9 Z. lang, Schwanz 11 Z. 4 Thlr.
9. *Canis mesomelas* Lin. Eben so. 2 F. 4 Z. lang, Schwanz 8 Z. 8 Thlr.
10. *Herpestes ruber* Desm. (*Cynictis Stedmanni* Ogilby) Eben so. 1 F. 1 Z. lang, der Schwanz 7 Z. 4 Thlr.

(*) Wo nicht ausdrücklich das Gegentheil angegeben ist, befinden sich jedesmal der Schädel und die Knochen der Läufe in der Haut. Alle gröfseren Häute sind aufgeweicht und präparirt, die kleineren von der Gröfse eines Fuchses und darunter im getrockneten Zustand.

11. *Macroscelides Eduardi* Smith. 6 Z. lang. 3 Thlr.
12. *Chrysochloris holosericea* Licht. 5 Z. lang. 2 Thlr.
13. *Antilope Oreas* Pall. Ein völlig ausgewachsenes männliches Exemplar der Elenn-Antilope $9\frac{1}{2}$ F. lang, 5 F. hoch mit fast 2 F. langem Gehörn. Einige Stellen an den Seiten ohne Haar. 200 Mark oder 80 Thlr.
14. *Antilope Oreas*. Ein Kalb derselben Art, 4 F. lang, gut erhalten. 10 Thlr.
15. *Antilope equina* Geoffr. Starkes männliches Exemplar mit dem Schädel, 7 F. 3 Z. lang, $4\frac{1}{2}$ F. hoch mit $1\frac{1}{2}$ F. langem Schwanz. Das linke Horn ist schon an dem lebenden Thier beschädigt gewesen. Die Haut vortrefflich; zur Probe ausgestopft. 60 Thlr.
16. *Antilope equina*. Haut von $6\frac{1}{2}$ F. Länge, völlig fehlerfrei mit dem Schädel, wahrscheinlich weiblichen Geschlechts. 60 Thlr.
17. *Antilope equina*. 7 F. lang, nicht ganz ohne Fehler der Haut aber von schönem Gehörn. 60 Thlr.
18. *Antilope equina*. Ganz eben so. 60 Thlr.
19. *Antilope equina*. Neugebornes Junges, $2\frac{1}{2}$ Fufs lang, ausgestopft. 10 Thlr.
20. *Antilope Gnu* Pall. Starkes männliches Exemplar von $7\frac{1}{4}$ F. Länge und 4 F. Höhe. Zur Probe ausgestopft. Einige kahle Stellen. 90 Mark oder 36 Thlr.
21. *Antilope Gnu*. Jüngerer Mannchen, $5\frac{3}{4}$ F. lang, sehr gut conditionirt. 30 Thlr.
22. *Antilope Melampus* Licht. Starkes männliches Exemplar von 5 F. Länge mit $1\frac{1}{2}$ F. langem Gehörn sehr schön erhalten. Bereits ausgestopft. 40 Thlr.
23. *Antilope Melampus*. Jüngerer Mannchen 4 F. lang, an mehreren Stellen kahle Flecken. 20 Thlr.
24. *Antilope Melampus*. Weibchen von $4\frac{3}{4}$ F. Länge, ganz ohne Tadel. 30 Thlr.
25. *Antilope Caama* Goldf. Ungewöhnlich starkes männliches Exemplar von 7 F. Länge, das Gehörn an der Wurzel von 8 Zoll Umfang. Die Haut ganz fehlerfrei. 60 Thlr.

26. *Antilope Pygarga* Pall. Männliches Exemplar von $5\frac{3}{4}$
F. Länge, vollkommen erhalten, mit dem Schädel. 24 Thlr.
27. *Antilope Pygarga*. Männchen, eben so. 24 Thlr.
28. *Antilope Pygarga*. Weibchen, von derselben Größe und gleich gut conditionirt. 20 Thlr.
29. *Antilope lunata* Smith. Die Abbildung in Smiths *Illustrations* ist einigermaßen verfehlt, indem sie das schöne Thier zu zart und schwächlich, die Grundfarbe des Leibes zu matt, die braune Zeichnung des Nasenrückens und der Läufe zu hell vorstellt. Auch ist die sehr eigenthümliche Bildung der Schnauze nicht daraus zu erkennen. Männliches Exemplar von 7 Fufs Länge. Sehr schöne Haut mit dem Schädel und 1 Fufs langen Hörnern. 50 Thlr.
30. *Antilope lunata*. Männchen, von $6\frac{1}{2}$ Fufs, sehr gut erhalten. 40 Thlr.
31. *Antilope lunata*. Weibchen, $6\frac{1}{2}$ Fufs, eben so. 40 Thlr.
32. *Antilope lunata*. Desgleichen $6\frac{1}{4}$ Fufs, ohne erhebliche Fehler. 36 Thlr.
33. *Antilope lunata*. Jüngeres Expl. von $5\frac{3}{4}$ Fufs. 30 Thlr.
34. *Antilope mergens* Blainv. (Duikerbok) Männchen von $3\frac{3}{4}$ Fufs. 4 Thlr.
35. *Lepus capensis*. Ein eben gebornes Junges. 1 Thlr.
36. *Sciurus albovittatus* Desm. (*Sc. setosus*) 1 Fufs lang, der Schwanz 8 Zoll. 2 Thlr.
37. *Sciurus albovittatus*. 11 Zoll, Schwanz $7\frac{1}{2}$. 2 Thlr.
38. *Georychus hottentottus* Lesson. 6 Zoll. 1 Thlr.
39. *Georychus hottentottus*. 5 Zoll. 1 Thlr.
40. *Euryotis irrorata* Brants. E. nigro-fusca, abdomine obscure cinereo; cauda vix dimidiam corporis partem aequans. Longit. corp. $7\frac{1}{2}$ poll., caudae $3\frac{1}{2}$. 2 Thlr.
41. *Euryotis irrorata*. 2 Thlr.
42. *Euryotis Brantsii* Smith. E. rufo-fusca, lateribus ferrugineis, abdomine candido; cauda longitudine trunci. Longit. corp. $6\frac{1}{2}$ poll., caudae $4\frac{1}{2}$. 3 Thlr.

43. *Euryotis Brantsii* Smith. 3 Thlr.
44. *Euryotis unisulcata* Fr. Cuv. E. rufo-fusca, abdomine griseo; cauda tertiam corporis partem aequans. Longit. corp. $6\frac{1}{2}$ poll., caudae $2\frac{1}{4}$. Not. cauda villosior, litura nigra dorsali. 3 Thlr.
45. *Euryotis unisulcata*. 3 Thlr.
46. *Euryotis obscura* Licht. E. nigrofusca, abdomine griseo, cauda longitudine trunci. Longit. corp. 5 poll., caud. 4. 3 Thlr.
47. *Euryotis lanuginosa* Licht. E. vellere mollissimo, canescenti-griseo, abdomine cano; cauda quartam corporis partem aequans. Longit. corp. 6 poll., caudae $1\frac{1}{2}$. 4 Thlr.
48. *Euryotis lanuginosa*. Etwas kleiner. 3 Thlr.
49. *Mus Pumilio* Lin. Gm. 1 Thlr.
50. *Mus Pumilio*. 1 Thlr.

II. Schädel.

51. *Antilope Oreas* sehr groß mit $1\frac{1}{2}$ Fufs langem Gehörn 10 Thlr.
52. *Antilope lunata*, wahrscheinlich von einem Weibchen. 8 Thlr.
53. *Antilope Pygarga*. 6 Thlr.
54. *Antilope Pygarga*. 6 Thlr.
55. *Equus Burchellii* } Diese 3 Schädel gehören zu den
56. Idem } unter No. 2. 3. 4. verzeichneten
57. Idem } Fellen, und können auf Verlan-
gen auch mit denselben verkauft
werden.
58. } Schädel von Hottentotten aus einer Höhle am Um-
59. } pukanie, ohne Unterkiefer, sonst gut erhalten. Je-
60. } der wird geschätzt auf 5 Thlr.

B. Vögel.

1. *Vultus occipitalis* Burch.
2. — id.
3. *Falco albescens* Daud.
4. — *imperialis*
5. — *Jacal* Daud.
6. — id.
7. — *musicus* Daud.
8. — id.
9. — *ater* L. Gm.
10. — *rupicola* n.
11. — id.
12. — *rupicola* n. Juv.
13. — *Gabar.* Daud. mas. adult.
14. — id.
15. — id.
16. — id. mas. juv.
17. — id.
18. — id. fem.
19. — *carbonarius* Licht. *F. (Nisus)* totus fuliginoso-niger unicolor, cera pedibusque flavis, rectricibus subtus fasciis 5 albis. Remiges albo nigroque obsolete fasciatae. Longit. 11 poll.
20. *Falco carbonarius* Licht.
21. — *melanopterus* adult. Daud.
22. — id.
23. — id. juv.
24. *Stria capensis* L. Gml.
25. — id.
26. — *helvola* Licht. *Str. (Brachyotus) helvola* (i. e. dilute canofusca,) facie alba, oculis nigro cinctis. Longit 14 poll. Pennae medii dorsi et pectoris unicolores, reliquae fasciis crebris undulatis marmoratae, abdomen sensim dilutius e numero et ambitu macularum albarum crescente, crisso pedumque lanugine albis; remiges ferrugineo fusco-

que fasciatis, rectrices fasciis talibus quinque, versus apicem sensim angustioribus.

27. *Strix flammea* Lin. *Str. cpensis* Smith.
 28. — id.
 29. — *leucotis* Temm.
 30. — id.
 31. — *Licua* Licht. Habitu (i. e. partium inter se ratione, praecipue remigum reetricumque longitudine mutua) et pictura, simillima *Str. passerinae* Lin. (*pygmaeae* Bechst.), sed major, 8-pollicaris, differt quoque reetricum fasciis 6 albis latioribus vix linearibus, sed interruptis, e-macula utrinque orbiculari conflatis, terminali nulla.
 32. — *Licua* Licht.
 33. *Lanius melanurus* Smith.
 L. macrourus ater, scapulis, tergo et remigum apice candidis. Statura Picae, Longit. trunci 5 poll., caudae gradatae 11 poll.
 Ob rostri formam validam abbreviatam attenuatam, ob vibrissas rigidas rostrum undique cum naribus tegentes et caudae formam singularem, a Laniis alienam, digna videtur avis, quae proprium genus constituat, quod nomine: *Basanistes* salutari placuit. Speciem *B. cissoidem* appellavimus.
 34. — *melanurus* Smith.
 35. — id.
 36. — *ornatus* n.
 37. — id.
 38. — *frenatus* Licht. (totus *senegalensis* sed dimidio minor.)
 39. — id.
 40. — *frenatus* var.
 41. — *collaris* L. Gml. Mas.
 42. — id. Fem.
 43. — *Cubla* n.
 44. — *Brubru* n.
 45. *Ceblepyris caesia* Licht.
 46. *Muscicapa diwaricata* Licht.
 47. — *tenella* Licht.

48. *Muscicapa tenella* Licht. *id.*
49. *Anthus Chloris* Licht. Long. $6\frac{1}{2}$ poll. Notae fusco, pennis nigris ferrugineo marginalis, gastraeo helvolo, medio abdomine, flexura alae et remigum majorum margine laete ranunculaceis. Reliqua ut in congeneribus.
50. *Anthus scapularis* Licht.
51. — id.
52. — id.
53. *Saxicola infusata* Smith.
54. *Anthus Raaltenii* Temm.
55. — *Richardi* Vieill.
56. — id.
57. *Motacilla capensis* Lin.
58. — id.
59. *Saxicola cursoria* n. adult.
60. — id. juvenis coloribus immixtis
61. — id.
62. — *incomta* Licht. adult.
63. — id.
64. — *coryphaea* n.
65. — *rubicola* Bechst. juv.
66. *Sylvia lactea* Licht. *Erythropygia paena* Smith.
67. — id.
68. — *limonella* n. *Le Citrin* Le Vaill. t. 427.
69. — id.
70. *Malurus tinniens* Licht. *Erythropygia?* Smith.
- M. pileo cerviceque fusco rufis, vertice nigro striato, pennis dorsi tectricibusque atris cinereo limbatis, remigibus reetricibusque nigris rufo marginalis his apice albedo, gastraeo toto cinereo.
- Huic affinis *M. ruficeps* Temm. ex Abyssinia, sed minor, verticis striis nullis, coloribus omnibus dilutionioribus.
71. *Sylvia madagascariensis* Lath.
72. — id.
73. — *grypania* n.
74. — *palustris* Bechst.
75. — id.

76. *Sylvia erythropygos* n. (Le Grignet Le Vaill.)
 77. — id.
 78. *Turdus olivaceus* n. adult.
 79. — id. n. juv.
 80. — id.
 81. — id.
 82. — *rupicola* n. fem.
 83. — *xanthopygos* Licht.
 84. — *aethiops* Licht.
 85. — id.
 86. — *crassirostris* Licht. T. dorso cinereo-canescente, abdomine albo maculis (congenerum) obcordatis atris undique consperso. Longit. $8\frac{1}{2}$ poll. Statura T. pilaris. Rostrum validum grypanium culmine carinato, mandibula basi flava angulo mentali prominulo. Tetrices alae infer. dilute ochraceae. Species insignis!
87. *Turdus crassirostris* Licht.
 88. *Lamprotornis Burchellii* Smith.
 89. — id.
 90. — id. junior.
 91. — id.
 92. — *bicolor* n.
 93. — *aurata* n.
 94. — id.
 95. *Gracula gallinacca* n.
 96. — id.
 97. *Alauda capensis* Lin. adult.
 98. — id.
 99. — *planicola* Licht.
 100. — id.
 101. — *rufopalliata* La Fren.
 102. — *albofasciata* La Fren.
 103. — id.
 104. — *grypania* Licht.
 105. — *cinerea* L. Gml. adult.
 106. — id.
 107. — id. juv.

108. *Alauda cinerea* L. Gml. juv.
 109. — id.
 110. — *verticalis* Licht. mas.
 111. — id.
 112. *Parus pensilis* Licht.
 113. — *capensis* Lath. Lin.
 114. — id.
 115. *Fringilla arcuata* L. Gml. mas.
 116. — *spadicea* Licht. Fr. (*Pyrgita*) cano cinerea, dorso medio alisque complicatis extus rufis, uropygio et pennis axillaribus ferrugineis, his apice albis. Longit. 6 poll. Guttur medium et abdomen albescentia. Mandibula flava, apice nigro. Cauda rotundata.
 117. *Fringilla brasiliensis* Lin. Gm. mas adult.
 118. — id.
 119. — id. m. juv.
 120. — id. fem.
 121. — id.
 122. — *granatina* Lin. m. adult.
 123. — id. m. juv.
 124. — id. fem.
 125. — *Astrila* n.
 126. — id.
 127. — *serena* n. mas adult.
 128. — id. mas juv.
 129. — *butyracea* Lin.
 130. — id.
 131. — id.
 132. — *lepidoptera* Licht. Fr. (*Estrilda*) cinerea remigibus rectricibusque nigris elegantissime albo-limbatis. Longit. 4 poll. Abdomen albescens, pennulae frontis et verticis eadem qua remiges pictura. Macula ante oculos et vitta utrinque collaris atra.
 133. *Fringilla lepidoptera* Licht.
 134. — *Quelea* n. fem.
 135. — id.

136. *Fringilla* n. sp. juv. An *Vidua axillaris* Smith. Fem.
137. — *uropygialis* Licht. Fr. (*Citrinella*) fusco-cinerea, dorso striato, uropygio laete ranunculaceo. Longit. $4\frac{1}{2}$ poll. — Abdomen medium argillaceum, lateribus striatis; remiges secundariae et rectrices intermediae albidomarginatae, reliquae apice albo.
138. *Fringilla uropygialis* Licht.
139. — *Taha*. n. juv. *Euplectes Taha* Smith.
140. — id. n. juv.
141. — *fuliginosa* Licht. Fr. (*Estrilda*), rostro coccineo apice nigro, dorso fuliginoso, abdomine cinereo. Longit. 4 poll.
142. *Fringilla nitens* fem.
143. — id.
144. — *cinnamomea* Licht. Fr. (*Pyrgita*); notaeo rufo, nigro striolato, gastraeo helvolo, tectricibus alae et remigum secund. margine cinnamomeis. Cauda profunde emarginata rectricibus intermediis margine externo cinnamomeis. Longit. 5 poll.
145. *Emberiza capistrata* Licht. mas. rufa, dorsi pennis medio nigris, capite atro lineis 7 albis capistrato; gatture atro. Longit. $5\frac{1}{2}$ poll. Remiges et rectrices nigrae, rufo limbatae. Abdomen cinnamomeum.
146. *Emberiza capistrata* Licht. m. juv.
147. *Ploceus haematocephalus* Licht. M. *Plocepasser Mahali* Smith.
148. — id. Fem.
149. — *socius* n. *Fring. socia* Daud. *Lox. socia* Lath. *Philaetherus lepidus* Swains.
150. *Ploceus socius* n. *Frin. socia* Daud. *Philaetherus lepidus* Swains.
151. *Ploceus subaureus* Smith. juv.
152. — id.
153. *Textor erythrorhynchus* Smith.
154. — id.
155. *Colius capensis* L. Gml.
156. — id.
157. — *indicus* Lath.
158. *Coracias natalensis* Licht. Tota statura *C. abyssinicae*. Rectri-

cibus extimis elongatis. Colores notaei omnes saturatio-
res, fronte gulaque sordide albis, macula parotica castanea,
jugulo pectoreque lilacinis, albo striolatis.

159. *Coracias natalensis* Licht.

160. *Buceros leucomelas* Licht. *B. ater*, abdomine caudaque apice
albis, tectricibus albis nigro-marginatis, rostro argute ca-
rinato bisulcato flavo apice castaneo. Longit. 17 poll.

Remigum secundar. intermediae duae albae, primariae
extus macula lineari alba notatae; rectrices albae, basi et
fascia media nigrae. Nares minutae ovaes ad basin sulci
inferioris. Tomia dentata et apex rostri castanea. Huic
affinis *B. melanoleucos* Licht. Bechst. *B. nasutus* Var. β .
Lath. Senegambiae incola, rostri forma et pictura facile
distinguendus.

161. *Buceros leucomelas* Licht.

162. *Epimachus unicolor* Licht. *E. supra* coeruleo-subtus viridi-ni-
tens, remigibus intus albo fasciatis, rostro nigro. Longit.
10 poll. — Junioribus guttur fuliginosum, rectrices ver-
sus apicem albo maculatae.

163. *Epimachus unicolor* Licht.

164. — id. juv.

165. — *erythrorynchos* n.

166. — id.

167. *Nectarinia scarlatina* n.

168. — *aurifrons* n.

169. *Upupa africana* n.

170. — id.

171. *Alcedo maxima* Pall.

172. — *rudis* Lin.

173. — *crinata* Lin.

174. — id.

175. *Cuculus glandarius* Lin.

176. — *cupreus* Lath.

177. — *auratus* Lgml.

178. — id.

179. *Pogonias unidentata* Licht.

180. — id.

181. *Picus guttatus* Licht. Affinis *P. nubico*, sed aliquanto major, dorso nigro, fasciis crebris albo-flavescentibus, pectore flavo maculis discretis orbicularibus nigris; abdomine medio citrino. Mas pileo toto, cervice, vittaque malari coccineis, Fem. pileo nigro, maculis confertis rotundatis albis, vitta malari et gula nigra.
182. *Picus guttatus* Licht.
183. — *olivaceus* Lgml.
184. — id.
185. — *fulviscapus* Licht. mas.
186. — — fem.
187. *Cypselus caffer* Licht.
188. *Hirundo rufifrons* Licht. *H.* fronte castanea, dorso chalybeo, subtus alba fascia pectorali nigra; cauda emarginata longitudine alarum, rectricibus pogonio interno macula quadrangulari alba. Longit. $6\frac{1}{2}$ poll. Affinis *H. ruficipiti* nubiæ, sed major et fascia pectorali nigra.
189. *Hirundo fuligula* Licht. *H.* fuliginosa, nitoris expers, subtus rufescens, cauda vix emarginata, rectricibus macula obliqua oblonga alba. Longit. 6 poll.
190. *Caprimulgus pectoralis* Cuv.
191. — id.
192. *Numida mitrata* Pall.
193. *Perdix perlata* Temm. mas.
194. — — fem.
195. — *clamator* Temm. mas.
196. — — fem.
197. — *afra* Lin.
198. — *natalensis* Smith.
199. — id.
200. *Pterocles tachypetes* Temm. mas.
201. — — fem.
202. *Columba capensis* Lath. mas.
203. — — fem.
204. — *senegalensis* Lin.
205. — ib.
206. — *risoria* Lin.

207. *Otis Rhaad.* LGml.
 208. *Oedinenemus macrocnemus* n.
 209. *Tachydromus bieinctus* Licht.
 210. — id.
 211. *Charadrius coronatus* LGml.
 212. — id.
 213. — *speciosus* Licht.
 214. — id.
 215. — *bitorquatus* n.
 216. — id.
 217. *Strepsilas interpretis* Ill.
 218. *Tringa pugnax* Lin. fem.
 219. — *subarquata* pt. mixta.
 220. — — pt. hyem.
 221. *Totanus glottis* Bechst.
 222. — *stagnatilis* Bechst.
 223. — id.
 224. *Scolopax capensis* Lin. juv.
 225. — *media* Bechst.
 226. *Grus carunculata* n.
 227. — *paradisea* Licht.
 228. — id.
 229. — *regulorum* Licht.
 230. — id.
 231. *Ardea cinerea* Lin.
 232. — *minuta* mas Lin.
 233. — id.
 234. — *castanea* LGml.
 235. *Ibis calva* Lath. mas.
 236. — *sacra* adult. (*aethiopica* n.)
 237. — — juv.
 238. *Crex Chloropus* n.
 239. — id.
 240. *Fulica mitrata* Pall. adult.
 241. — id.
 242. — — pullus.
 243. *Plotus Levaillanti* n.

244. *Anas pileata* Licht. Tota statura Querquedulae; pileo nigro, vitta superciliari nulla, gula genisque sordide albis, collo circum undique maculato, dorso squamato, abdomine dilute ferrugineo. Remiges secundariae atrae apice albo, tectrices aeneo-virides, inde speculum simplex album, nigro utrinque argute marginatum.
245. *Anas pileata* Licht.
246. — *leucocephala* Fem.
247. — *erythrorynchos* L. Gml.
248. — id.
249. — id.
250. — id.
251. — *capensis* Lin. Gml.
252. — id.
253. — *cana* mas Gml.
254. *Anser aegyptiacus* n.
255. — *gambensis* Bechst.
256. *Colymbus capensis* Licht. adult.
257. — id.

Varia.

1. Zwei getrocknete Fische, eine Art von *Cyprinas* aus dem Umpukanie-Fluss.
2. Ein Karofs oder Mantel der Beetjuanen, aus an einander genähten Antilopen-Fellen.
3. Ein dergleichen, etwas kleiner.
4. Ein kupferner Armring.
5. Ein dergl.
6. Ein Hut der Mantatih-Beetjuanen, aus Binsen geflochten.
7. Eine Tabacksdose derselben, aus einer Frucht geschnitzt.
8. Ein Sack von Leder mit den Samen der *Erythrina Corallo-dendron* gefüllt, etwa 8 Pfund an Gewicht.

C. Käfer-Sammlung.

Der nachstehend verzeichnete Theil einer Insectensammlung ist in Kisten mit Glasdeckeln aufbewahrt, nach dem neuesten Catalog von Dejean geordnet und mit Sorgfalt bestimmt. Die einheimischen Arten sind meist in vier und mehr Exemplaren vorhanden, auch an exotischen Arten ist die Sammlung reich, und sind auch diese öfter in mehreren Individuen vorhanden. Beide, sowohl die einheimischen, als exotischen zeichnen sich durch musterhafte Behandlung aus. Die Versteigerung geschieht nach den einzelnen Kästen, und diese enthalten

1. Curculionen, (*Phytobius* — *Coelosternus*) etwa 156 St.
2. desgl. (*Tylodes* — *Rhyncolus*) etwa 238. St.
3. Sämmtliche Xylophagen (*Hylurgus* — *Brontes*) etwa 222 St.
4. Cerambycinen Prionen (*Parandra* — *Megaderus*) etwa 30 St.
5. desgl. (*Lissonotus* — *Aromia*) etwa 28 St.
6. desgl. (*Litopus* — *Clytus*) etwa 160 St.
7. desgl. (*Stenygra* — *Monohammus*) etwa 78. St.
8. desgl. — Lamien — (*Batocera* — *Mesosa*) etwa 35 St.
9. desgl. (*Dorcadion* — *Pachyta*) etwa 106 St.
10. Lepturen, Donacien, Megalopen u. s. w. (*Oedecnema* — *Hispa*) etwa 191 St.
11. Sämmtl. Cassiden, besonders reich und schön, etwa 207 St.
12. Die Gallerucen und Halticen, etwa 352 St.
13. Die eigentl. Chrysomelen, (*Doryphora* — *Podontia*) etwa 280 St.
14. Die Colaspen, Clythren, Cryptocephalen, etwa 352 St.
15. Die Clavipalpen und sämmtl. Trimeren (*Erotylus* — *Claviger*) etwa 260 St.
- 16 Das Spinde, zu welchem die Kästen gehören.

Anhang

Mexicanischer Gegenstände.

1. *Sciurus rufiventris* n.
2. — idem
3. *Nasua fusea* Juv.
4. *Falco Tyrannus* Pr. Max.
5. *Picus Melampogon* Licht.
6. *Trochilus hemileucurus* Licht. Mas.
7. — idem Fem.
8. — *fulgidus* Licht.
9. — *verticalis* Licht.
10. — idem
11. — *beryllinus* Licht.
12. — idem
13. — *colubris* Lin.
14. — *rufus* L. Gm. Juv.
15. — idem
16. — *coruseus* Licht. *T. cyanopogon* Less.
17. — idem
18. *Quiscalda fulgida* Daud.
19. *Icterus phoeniceus* Daud.
20. — idem
21. — *perspicillatus* Licht.
22. — *gularis* Licht.
23. — *Baltimore* Daud.
24. — *calandra* Daud.
25. — *varius* Daud.
26. *Corvus peruvianus* L. Gml.
27. *Turdus erythrophthalmus* Licht.
28. — *rufus* Lin.

29. *Turdus melodus* Wils.
30. — *auricapillus* L. Gm.
31. — *carolinensis* L. Gm.
32. *Prionites Momota* Ill.
33. *Dendrocolaptes pectinicaudus* Licht.
34. *Campylops hamulus* Licht.
35. *Sylvia Trichas* Lath.
36. — *americana* Lath.
37. — *aestiva* Lath.
38. — *minuta* Wils.
39. — *Brissonii* Lath.
40. — *Blackburnia* Lath.
41. — *virens* Lath.
42. — *aurigula* Licht.
43. — *canadensis* Lath.
44. *Fringilla cardinalis* n.
45. — *erythroptalma* Lath.
46. — *haemorrhoea* Licht.
47. — *coerulea* Lin.
48. — *acanthura* L. Gm.
49. — *rhodocampter* Licht.
50. — *idem*.
51. — *lippa* Licht.
52. — *melanoxantha* Licht.
53. — *tristis* Lin.
54. — *icterica* n.
55. — *Jacarina* Lin.
56. *Alauda alpestris* L. Gm.
57. *Tanagra Gnatho* Licht.
58. — *aestiva* Lin. Mas.
59. — *idem* Juv.
60. — *Sialis* n.
61. — *auricollis* Licht.
62. — *archiepiscopus* Lath.
63. — *vitellina* Licht.
64. *Euphonia Tibicen* n.
65. *Muscicapa cayanensis* L. Gm.

66. *Muscicapa coronata* Lath.
 67. — *ruticilla* L. Gm.
 68. — *larvata* Licht.
 69. *Hypothymis mexicana* Licht.
 70. — *idem*.
 71. *Hirundo prasina* Licht.
-

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00307411 9

crlsru QL72.V57

Verzeichniss einer Sammlung von Säugeth